

ÉPIDÉMIE DU VIH À PARIS

POUR UNE RÉGION SANS SIDA




Août 2026 • www.ors-idf.org

CETTE PUBLICATION APPORTE UN ÉCLAIRAGE SUR LES SPÉCIFICITÉS DU DÉPARTEMENT ET LES DISPARITÉS INFRA-DÉPARTEMENTALES DE L'ÉPIDÉMIE EN ANALYSANT LES DONNÉES DE DÉPISTAGE, DE NOUVEAUX DIAGNOSTICS ET DE PRISE EN CHARGE. CES ÉLÉMENTS CONSTITUENT UN APPUI À LA COMPRÉHENSION DES ENJEUX LOCAUX ET À L'ADAPTATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION, DE DÉPISTAGE ET D'ACCÈS AUX SOINS.

I- L'ENJEU DU DÉPISTAGE, UNE ÉPIDÉMIE SILENCIEUSE

Cascade de soins du VIH en Île-de-France, 2023



Sources : SNDS, ANRS C04 FHDH, ANRS C03 AquiviH, Exploitation et algorithme Inserm/iPLesp, estimation Santé publique France

Estimation du nombre de personnes non diagnostiquées à Paris en 2024

	Nbre de personnes non diagnostiquées	%	IC95%
Population générale	1088	100,0	[962,1214]
Hétérosexuel(e)s né(e)s à l'étranger	320	29,4	[256,383]
Hétérosexuel(e)s né(e)s en France	117	10,8	[70,163]
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) nés à l'étranger	249	22,9	[195,304]
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) nés en France	325	29,9	[265,385]
Autres	77		

Source : Santé publique France

L'ONUSIDA a fixé pour 2030 les objectifs 95-95-95 en matière de dépistage du VIH, de traitement et de suppression virale. En 2023, à Paris, la proportion estimée de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) diagnostiquées a atteint le premier objectif. Par contre, seulement 94 % des personnes connaissant leur statut étaient traitées. La proportion de PVVIH traitées avec charge virale indétectable était de 97 % (au seuil de 200/mm³).



À Paris,

1 088

cas estimés de VIH non détectés en 2024


En 2024, d'après les données des déclarations obligatoires, Santé publique France estimait à 1088 le nombre de personnes à Paris ignorant leur séropositivité. Parmi ces personnes non diagnostiquées, 40,6 % étaient nées en France et 52,8 % concernaient des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH).

II- DÉPISTAGE

À Paris, le taux de personnes ayant effectué au moins un test de dépistage du VIH en 2023 est de 8010 pour 100 000 habitants.

Le département présente un taux significativement supérieur au niveau régional. C'est le taux le plus important de tous les départements franciliens.


Taux standardisé de personnes ayant effectué au moins un dépistage VIH dans l'année 2023
Pour 100 000




Source : SNDS, exploitation ORS Île-de-France

Les taux de chacun des arrondissements sont supérieurs au niveau moyen régional. À l'échelle de l'arrondissement, ceux du centre et du nord-est affichent les taux les plus élevés du département (les 1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e, 10^e et 11^e arrondissements présentent tous des taux supérieurs à 9000 pour 100 000 habitants).

Taux standardisé de personnes ayant effectué au moins un dépistage VIH dans l'année, 2023
dans les arrondissements parisiens



Taux standardisés pour 100 000



Source : SNDS 2023



Taux de sérologie positive
pour 1 000 sérologies

3,3 ‰

à Paris

2,5 ‰ en Île-de-France


0,9 ‰ en France

Source : labo VIH Santé publique France

Le nombre de tests pratiqués dans le cadre des dispositifs «VIH Test» devenus «Mon test IST» augmente fortement depuis janvier 2022, avec un pic entre avril 2024 puis un deuxième à la mise en place du dispositif Mon Test IST en octobre 2024.


Se reporter en page 7 pour plus d'informations sur les taux standardisés et les dispositifs de dépistage.

Evolution du nombre de tests «VIH Test» et «Mon test IST» janvier 2022 et décembre 2024



Source : Assurance maladie

Caractéristiques 2014-2023



À Paris

624 nouveaux cas de VIH entre 2022 et 2023

Une étude, réalisée auprès des cinq CoReSS (anciennement COREVIH) d'Île-de-France a permis de collecter des données sur les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Elle concernait les PVVIH majeures, diagnostiquées entre 2014 et 2023, résidant en Île-de-France et prises en charge dans l'un des centres.

Entre 2014 et 2023, au sein des CoReSS, 4 316 personnes ont été diagnostiquées pour la première fois, représentant 35 % des nouveaux diagnostics de la région.

La plupart des nouveaux diagnostics concerne les hommes (75%), les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (59%) et les personnes nées à l'étranger (58%). En combinant le sexe, le mode de contamination et la région de naissance : les plus touchés sont HSH nés en France (34%), les femmes nées à l'étranger (19%) et les hommes non HSH nés à l'étranger (15%).

42% des PVVIH habitant à Paris sont diagnostiquées à un stade tardif et 37% à un stade précoce. Le pourcentage de dépistage tardif est en constante augmentation entre 2014-2015 et 2022-2023 (de 39% à 47%).


Équipe Coincide

Corevih Nord
(Yazdanpanah Y, Ghosn J, Legac S, Digumber M),
Corevih Est
(Rozenbaum W, Brun A), Corevih Ouest (Caby F, J Gerbe J),
Corevih Sud (Duvivier C, Richier L, Pietri MP),
Corevih Centre (Valantin MA, Agher R, Hamidi M)
INSERM U1136
(Caby F, Rochas-Chaves A, Mary-Krause M, Chauvin P(ERES, équipe de recherche en épidémiologie sociale)

INSERM U1295

(Delpierre C, CERPOP (Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations)


À Paris, parmi les PVVIH , 91% d'entre elles sont prises en charge à Paris, 8% en petite couronne et 1% en grande couronne sur la période 2014-2023.



Évolutions


Le nombre de nouveaux diagnostics a baissé entre 2014 et 2021 à Paris. Il atteint son niveau le plus bas en 2020-2021. Depuis, ce nombre est de nouveau à la hausse mais encore très en dessous du niveau de 2018.

Evolution du nombre de nouveaux diagnostics depuis 2014



Groupes de population à risque de transmission : évolution du nombre de nouveaux diagnostics depuis 2014


Selon le groupe à risque de transmission, le nombre de nouveaux diagnostics chez les personnes nées à l'étranger augmente chez les femmes, chez les HSH et légèrement chez les hommes non-HSH. Il diminue chez les hommes nés en France HSH ou hétérosexuels.



Disparités territoriales

Taux standardisé des nouveaux diagnostics chez les hommes sur la période 2014-2023

dans les arrondissements à Paris




0 3 km
© L'INSTITUT PARIS REGION, ORS-IdF 2026



Chez les hommes parisiens, entre 2014 et 2023, le taux de nouveaux diagnostics est de 323 pour 100 000 habitants (significativement supérieur à la moyenne régionale 171 pour 100 000). C'est le taux standardisé le plus élevé des départements franciliens.

À l'échelle infra-départementale, la carte révèle une forte hétérogénéité territoriale et permet d'identifier les territoires prioritaires pour le contrôle de l'épidémie. Les taux les plus élevés sont compris entre 443 et 844 dans les arrondissements du centre (1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e) et entre 367 et 510 dans le nord-est parisien (10^e, 11^e, 18^e, 19^e, 20^e).


Taux standardisés pour 100 000



Sources : Inter COREVIH 2014-2023, Insee RP 2019

Taux standardisé des nouveaux diagnostics chez les femmes sur la période 2014-2023

dans les arrondissements à Paris



0 3 km
© L'INSTITUT PARIS REGION, ORS-IdF 2026




Chez les femmes parisiennes, le taux de nouveaux diagnostics est de 71 pour 100 000 habitantes (65 en moyenne en Île-de-France), il est plus faible que chez les hommes. C'est le troisième taux standardisé le plus élevé de la région après la Seine-Saint-Denis et l'Essonne.

À l'échelle infra-départementale, de très fortes disparités sont également observées. Dans l'ordre croissant les 19^e, 20^e, 10^e et 18^e arrondissements sont les plus touchés. On observe dans le 18^e un taux plus de trois fois supérieur à celui du 16^e, arrondissement avec le taux le moins élevé.

Se reporter en page 7 pour plus d'informations sur les taux standardisés.

Taux standardisés pour 100 000




Sources : Inter COREVIH 2014-2023, Insee RP 2019

À Paris, près de 21 000 personnes prises en charge pour le VIH en 2023

Taux standardisé de personnes prises en charge pour infection au VIH à Paris et France métropole, 2023

Pour 100 000




Source : Cartographie des pathologies, SNDS, Assurance maladie - Exploitation ORS Île-de-France

Taux standardisé des personnes prises en charge pour VIH en 2023 dans les arrondissements à Paris

Hommes

Chez les hommes, Paris regroupe le plus grand nombre de personnes prises en charge pour le VIH avec un taux standardisé de 1440 pour 100 000, près de cinq fois le taux observé dans les Yvelines. Les arrondissements centraux (1^{er}, 2^e, 3^e et 4^e) présentent les taux les plus importants entre 2962 et 3055.



N 0 3 km


© L'INSTITUT PARIS REGION, ORS-IdF 2026



Chez les femmes, Paris est le deuxième département francilien le plus touché (423 pour 100 000) après la Seine-Saint-Denis. On observe les taux les plus importants dans le 20^e arrondissement (707), 19^e arrondissement (620) et 18^e arrondissement (607).




Femmes



Se reporter en page 7 pour plus d'informations sur les taux standardisés.

Taux standardisés
pour 100 000



Source : Cartographie des pathologies, SNDS, Assurance Maladie - Exploitation ORS Île-de-France

N 0 3 km

© L'INSTITUT PARIS REGION, ORS-IdF 2026



Définitions

➔ **Dépistage précoce** : si la séropositivité est découverte avec 500 CD4/mm³ ou plus.

➔ **Dépistage tardif** : si la séropositivité est découverte au stade sida ou avec moins de 200 CD4/mm³.

➔ **VIH Test** : ce dispositif, mis en place en janvier 2022 pour faciliter l'accès au dépistage, concernait les assurés sociaux et leurs ayants droit (dont les bénéficiaires de l'aide médicale gratuite ou aide médicale d'État). Il a été remplacé par « Mon test IST » en septembre 2024.

➔ **Mon test IST** : depuis le 1^{er} septembre 2024, ce dispositif complète l'accès direct aux dépistages du VIH par quatre infections sexuellement transmissibles (IST), syphilis, hépatite B, gonorrhée et chlamydie. Mon test IST est accessible à la demande de la personne : sans ordonnance, sans rendez-vous, avec une prise en charge à 100%, sans avance de frais pour tous pour le VIH et uniquement pour les moins de 26 ans pour les quatre IST.

➔ **Taux standardisé** : taux que l'on observerait si les populations avaient la même structure par âge qu'une population de référence, ici la population française au recensement de la population de 2006. Les taux standardisés éliminent les effets de la structure d'âge et autorisent les comparaisons entre les périodes, entre les sexes et entre les territoires.

Pour en savoir plus

➔ **ORS. Epidémiologie du VIH/sida en Île-de-France depuis 1999**
<http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/pathologies/vih-sida>

➔ **Coincide : Cartographie infra départementale des nouveaux diagnostics**
Données 2014-2023 en Île-de-France
<https://www.ors-idf.org/cartes-donnees/coincide/>

➔ **ARS Île-de-France. Journée mondiale de lutte contre le sida 2025**
Communiqué et podcast «VIH : Objectif zéro transmission en Île-de-France»
<https://www.iledefrance.ars.sante.fr/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-vih-2025-lanrs-maladies-infectieuses-emergentes-et-lars-ile-de>

➔ **CRIPS Île-de-France. Centre de ressources**
VIH/sida, IST, hépatites, drogues et comportements à risque chez les jeunes
<http://www.lecrips-idf.net/>

➔ **Santé publique France**
• Données issues des différents systèmes de surveillance du VIH/sida
<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-VIH-et-sida>
• Bulletin VIH et IST bactériennes : <https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/bulletin-regional/2025/vih-et-ist-bacteriennes-en-ile-de-france.-bilan-2024>

➔ **Epi-Phare**
Suivi de l'utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH
<https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/suivi-prep-vih-2025/>

➔ **Assurance maladie**
Données de la cartographie des pathologies
<https://data.ameli.fr/pages/data-pathologies/>

Sources de données

➔ **Données de positivité à partir de LaboVIH** : données arrêtées en juillet 2025, données issues de l'enquête 2024 réalisée auprès de l'ensemble des laboratoires de biologie médicale, exploitation Santé publique France. Ces données concernent l'ensemble des sérologies réalisées par les laboratoires en 2024, remboursées ou non, avec ou sans prescription médicale, quels que soient les lieux de prélèvement (laboratoire de ville, hôpital ou clinique, CeGIDD...).

➔ **Déclarations obligatoires (DO)** : les analyses sur les caractéristiques des personnes ayant découvert leur séropositivité entre juillet 2013 et juin 2018 sont issues des données obligatoires au 31/08/2018. Il s'agit de données brutes et provisoires non redressées pour les délais de déclaration pour les années 2016 à 2018. De plus les pourcentages sont calculés après exclusion des valeurs inconnues pour chacune des caractéristiques.

➔ **VIH-Test et Mon test IST** :
extraction CNAM du 17/09/2025

➔ **SNDS - Système national des données de santé** : cartographie des pathologies 2022 algorithme de sélection des personnes prises en charge pour infection par le VIH : ayant une ALD en cours l'année n, avec codes CIM10 de maladie due au virus de l'immunodéficience humaine, ou hospitalisation en MCO (DP, DR ou GHM) ou RIM-P (DP ou DA) pour ces mêmes motifs dans les cinq dernières années, ou hospitalisation en MCO l'année n pour tout autre motif avec une infection par le VIH comme complication ou morbidité associée (DA, ou DP ou DR d'un des RUM), ou au moins trois délivrances d'au moins un médicament spécifique au traitement de l'infection par le VIH dans l'année n à différentes dates, ou personnes ayant eu un acte de biologie médicale spécifique de l'infection par le VIH dans l'année n. Les taux standardisés ont été calculés avec comme dénominateur le référentiel des bénéficiaires ayant consommé au moins une fois un soin dans les trois dernières années.

En savoir plus :



ORS-IDF.ORG