

ÉPIDÉMIE DU VIH DANS LE VAL-D'OISE

POUR UNE RÉGION SANS SIDA




Août 2026 • www.ors-idf.org

CETTE PUBLICATION APPORTE UN ÉCLAIRAGE SUR LES SPÉCIFICITÉS DU DÉPARTEMENT ET LES DISPARITÉS INFRA-DÉPARTEMENTALES DE L'ÉPIDÉMIE EN ANALYSANT LES DONNÉES DE DÉPISTAGE, DE NOUVEAUX DIAGNOSTICS ET DE PRISE EN CHARGE. CES ÉLÉMENTS CONSTITUENT UN APPUI À LA COMPRÉHENSION DES ENJEUX LOCAUX ET À L'ADAPTATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION, DE DÉPISTAGE ET D'ACCÈS AUX SOINS.

I- L'ENJEU DU DÉPISTAGE, UNE ÉPIDÉMIE SILENCIEUSE

Cascade de soins du VIH en Île-de-France, 2023



Sources : SNDS, ANRS CO4 FHDH, ANRS CO3 AquiviH, Exploitation et algorithme Inserm/IPLesp, estimation Santé publique France

L'ONUSIDA a fixé pour 2030 les objectifs 95-95-95 en matière de dépistage du VIH, de traitement et de suppression virale. En 2023, dans le Val-d'Oise, la proportion estimée de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) diagnostiquées restait inférieure à l'objectif avec 94 %. Le taux de personnes connaissant leur statut et traitées a atteint l'objectif de 97 %. Et enfin, la proportion de PVVIH traitées avec charge virale indétectable était de 95 % (au seuil de 200/mm³).



Estimation du nombre de personnes non diagnostiquées dans le Val-d'Oise en 2024

	Nbre de personnes non diagnostiquées	%	IC95%
Population générale	306	100,0	[230,383]
Hétérosexuel(e)s né(e)s à l'étranger	130	42,5	[88,173]
Hétérosexuel(e)s né(e)s en France	48	15,7	[12,84]
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) nés à l'étranger	51	16,7	[24,79]
Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) nés en France	65	21,2	[34,97]
Autres	12		

Source : Santé publique France

Dans le Val-d'Oise,

306

cas estimés de VIH non détectés en 2024


En 2024, d'après les données des déclarations obligatoires, Santé publique France estimait à 306 le nombre de personnes du Val-d'Oise ignorant leur séropositivité. Parmi ces personnes non diagnostiquées, 37 % étaient nées en France et 38 % concernaient des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH).

II- DÉPISTAGE

Dans le Val-d'Oise, le taux de personnes ayant effectué au moins un test de dépistage du VIH en 2023 est de 5853 pour 100 000 habitants.

Le département présente un taux inférieur au niveau régional (6 494 pour 100 000).

Taux standardisé de personnes ayant effectué au moins un dépistage VIH dans l'année 2023 Pour 100 000




Source : SNDS, exploitation ORS Île-de-France

Dans le département, les taux de dépistage sont assez faibles et vont de 4852 pour 100 000 habitants dans le Vexin Val de Seine, à 6 149 dans le territoire de Roissy Pays de France.

Taux standardisé de personnes ayant effectué au moins un dépistage VIH dans l'année, 2023 dans les intercommunalités du Val-d'Oise


Taux standardisés pour 100 000




Source : SNDS 2023



Source : labo VIH Santé publique France



Evolution du nombre de tests «VIH Test» et «Mon test IST» janvier 2022 et décembre 2024







Source : Assurance maladie

Le nombre de tests pratiqués dans le cadre des dispositifs «VIH Test» devenus «Mon test IST» augmente fortement depuis janvier 2022, avec trois pics en novembre 2023 puis en février et avril 2024 avant de diminuer fortement jusqu'en août 2024 et un autre petit pic à la mise en place du dispositif Mon Test IST en octobre 2024.

Se reporter en page 7 pour plus d'informations sur les taux standardisés et les dispositifs de dépistage.

Caractéristiques 2014-2023



Dans le Val-d'Oise, **163** nouveaux cas de VIH entre 2022 et 2023

Une étude, réalisée auprès des cinq CoReSS (anciennement COREVIH) d'Île-de-France a permis de collecter des données sur les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Elle concernait les PVVIH majeures, diagnostiquées entre 2014 et 2023, résidant en Île-de-France et prises en charge dans l'un des centres.


Entre 2014 et 2023, 884 PVVIH habitantes du Val-d'Oise prises en charge au sein de ces structures ont été diagnostiquées pour la première fois, représentant 7% des nouveaux diagnostics de la région.

La majorité des nouveaux diagnostics concerne les hommes (61%), les hétérosexuels (66%) et les personnes nées à l'étranger (67%). En combinant le sexe, le mode de contamination et la région de naissance : les plus touchés sont les femmes nées à l'étranger (31%), les hommes - non HSH - nés à l'étranger (26%) et les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes nés en France (18%).

30% des PVVIH sont diagnostiquées à un stade tardif précoce et 52% à un stade tardif. Le pourcentage de dépistage tardif est le plus fort en 2016-2019 avec 55% des nouveaux diagnostics.

Équipe Coincide
Corevih Nord
(Yazdanpanah Y, Ghosn J, Legac S, Digumber M),
Corevih Est
(Rozenbaum W, Brun A), Corevih Ouest (Caby F, J Gerbe J),
Corevih Sud (Duvivier C, Richier L, Pietri MP),
Corevih Centre (Valantin MA, Agher R, Hamidi M)
INSERM U1136
(Caby F, Rochas-Chaves A, Mary-Krause M, Chauvin P(ERES, équipe de recherche en épidémiologie sociale)
INSERM U1295
(Delpierre C, CERPOP (Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations)


Parmi les PVVIH habitant le Val-d'Oise, 31% sont prises en charge à Paris, 16% sont prises en charge en petite couronne et 53% en grande couronne sur la période 2014-2023.



Évolutions


Dans le Val-d'Oise, le nombre de nouveaux diagnostics a baissé de 16% entre 2014-2015 et 2022-2023. Il atteint son niveau le plus bas en 2020-2021 en lien probable avec la pandémie de covid-19. Depuis, ce nombre est de nouveau à la hausse mais reste en dessous de 2018-2019.

Evolution du nombre de nouveaux diagnostics depuis 2014



Dans la plupart des populations à risque du département, on observe une baisse globale du nombre de nouveaux diagnostics VIH entre 2014-2015 et 2020-2021 chez les femmes et les hommes non HSH nés à l'étranger. En revanche, le nombre de nouveaux diagnostics chez les HSH nés en France et ceux nés à l'étranger a augmenté.

Groupes de population à risque de transmission : évolution du nombre de nouveaux diagnostics depuis 2014




Taux standardisé des nouveaux diagnostics chez les hommes sur la période 2014-2023 dans les intercommunalités du Val-d'Oise



Chez les hommes du Val-d'Oise, le taux de nouveaux diagnostics est de 110 pour 100 000 habitants (significativement inférieur à la moyenne régionale 171 pour 100 000). C'est le deuxième taux standardisé le plus faible des départements franciliens après les Yvelines.


À l'échelle infra-départementale, Argenteuil (167) et « Cergy-Pontoise » (133) présentent les taux les plus élevés de nouveaux diagnostics.



N 0 10 km
© L'INSTITUT PARIS REGION, ORS-IdF 2026



Taux standardisés pour 100 000



Sources : Inter COREVIH 2014-2023, Insee RP 2019

Taux standardisé des nouveaux diagnostics chez les femmes sur la période 2014-2023 dans les intercommunalités du Val-d'Oise



Chez les femmes du département, le taux de nouveaux diagnostics est de 61 pour 100 000 habitantes (65 en moyenne en Île-de-France), il est plus faible que chez les hommes. C'est le quatrième taux standardisé féminin le plus faible des départements franciliens après les Hauts-de-Seine et les Yvelines et la Seine-et-Marne.

À l'échelle infra-départementale, on trouve le taux le plus élevé dans le Val-d'Oise à « Cergy-Pontoise » (133).


Se reporter en page 7 pour plus d'informations sur les taux standardisés. vv



N 0 10 km
© L'INSTITUT PARIS REGION, ORS-IdF 2026



Taux standardisés pour 100 000




Sources : Inter COREVIH 2014-2023, Insee RP 2019

Dans le Val-d'Oise,
4 700
personnes prises en charge
pour le VIH en 2023

Taux standardisé de personnes prises en charge pour infection au VIH
dans le Val-d'Oise et France métropole, 2023

Pour 100 000




Source : Cartographie des pathologies, SNDS, Assurance maladie - Exploitation ORS Île-de-France

Taux standardisé des personnes prises en charge pour VIH en 2023
dans les intercommunalités du Val-d'Oise

Hommes


Chez les hommes du Val-d'Oise, le taux standardisé de personnes prises en charge pour le VIH est de 375 pour 100 000. Ce taux est inférieur au taux francilien et supérieur au taux français. Les intercommunalités du département présentant les plus forts taux standardisés sont par ordre décroissant : « Roissy Pays de France » (462), « Cergy-Pontoise » (421) et « Haut-Val-d'Oise » (376) ainsi que la commune d'Argenteuil (514).



Chez les femmes du département, le taux de personnes prises en charge pour le VIH est de 336 pour 100 000. Ce taux est comparable au taux francilien et supérieur au taux français. « Roissy Pays de France » (437), « Cergy-Pontoise » (405) ainsi que la commune d'Argenteuil (427) présentent les taux standardisés les plus importants.




Femmes



Se reporter en page 7 pour plus d'informations sur les taux standardisés.

Taux standardisés
pour 100 000



Source : Cartographie des pathologies, SNDS, Assurance Maladie - Exploitation ORS Île-de-France

Définitions

➔ **Dépistage précoce** : si la séropositivité est découverte avec 500 CD4/mm³ ou plus.

➔ **Dépistage tardif** : si la séropositivité est découverte au stade sida ou avec moins de 200 CD4/mm³.

➔ **VIH Test** : ce dispositif, mis en place en janvier 2022 pour faciliter l'accès au dépistage, concernait les assurés sociaux et leurs ayants droit (dont les bénéficiaires de l'aide médicale gratuite ou aide médicale d'État). Il a été remplacé par « Mon test IST » en septembre 2024.

➔ **Mon test IST** : depuis le 1^{er} septembre 2024, ce dispositif complète l'accès direct aux dépistages du VIH par quatre infections sexuellement transmissibles (IST), syphilis, hépatite B, gonorrhée et chlamydie. Mon test IST est accessible à la demande de la personne : sans ordonnance, sans rendez-vous, avec une prise en charge à 100%, sans avance de frais pour tous pour le VIH et uniquement pour les moins de 26 ans pour les quatre IST.

➔ **Taux standardisé** : taux que l'on observerait si les populations avaient la même structure par âge qu'une population de référence, ici la population française au recensement de la population de 2006. Les taux standardisés éliminent les effets de la structure d'âge et autorisent les comparaisons entre les périodes, entre les sexes et entre les territoires.

Pour en savoir plus

➔ **ORS. Epidémiologie du VIH/sida en Île-de-France depuis 1999**
<http://www.ors-idf.org/index.php/fr/publications/pathologies/vih-sida>

➔ **Coincide : Cartographie infra départementale des nouveaux diagnostics**
Données 2014-2023 en Île-de-France
<https://www.ors-idf.org/cartes-donnees/coincide/>

➔ **ARS Île-de-France. Journée mondiale de lutte contre le sida 2025**
Communiqué et podcast «VIH : Objectif zéro transmission en Île-de-France»
<https://www.iledefrance.ars.sante.fr/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-vih-2025-lanrs-maladies-infectieuses-emergentes-et-lars-ile-de>

➔ **CRIPS Île-de-France. Centre de ressources**
VIH/sida, IST, hépatites, drogues et comportements à risque chez les jeunes
<http://www.lecrips-idf.net/>

➔ **Santé publique France**
• Données issues des différents systèmes de surveillance du VIH/sida
<http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/VIH-sida-IST/Infection-a-VIH-et-sida>
• Bulletin VIH et IST bactériennes : <https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ile-de-france/documents/bulletin-regional/2025/vih-et-ist-bacteriennes-en-ile-de-france.-bilan-2024>

➔ **Epi-Phare**
Suivi de l'utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH
<https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/suivi-prep-vih-2025/>

➔ **Assurance maladie**
Données de la cartographie des pathologies
<https://data.ameli.fr/pages/data-pathologies/>

Sources de données

➔ **Données de positivité à partir de LaboVIH** : données arrêtées en juillet 2025, données issues de l'enquête 2024 réalisée auprès de l'ensemble des laboratoires de biologie médicale, exploitation Santé publique France. Ces données concernent l'ensemble des sérologies réalisées par les laboratoires en 2024, remboursées ou non, avec ou sans prescription médicale, quels que soient les lieux de prélèvement (laboratoire de ville, hôpital ou clinique, CeGIDD...).

➔ **Déclarations obligatoires (DO)** : les analyses sur les caractéristiques des personnes ayant découvert leur séropositivité entre juillet 2013 et juin 2018 sont issues des données obligatoires au 31/08/2018. Il s'agit de données brutes et provisoires non redressées pour les délais de déclaration pour les années 2016 à 2018. De plus les pourcentages sont calculés après exclusion des valeurs inconnues pour chacune des caractéristiques.

➔ **VIH-Test et Mon test IST** :
extraction CNAM du 17/09/2025

➔ **SNDS - Système national des données de santé** : cartographie des pathologies 2022 algorithme de sélection des personnes prises en charge pour infection par le VIH : ayant une ALD en cours l'année n, avec codes CIM10 de maladie due au virus de l'immunodéficience humaine, ou hospitalisation en MCO (DP, DR ou GHM) ou RIM-P (DP ou DA) pour ces mêmes motifs dans les cinq dernières années, ou hospitalisation en MCO l'année n pour tout autre motif avec une infection par le VIH comme complication ou morbidité associée (DA, ou DP ou DR d'un des RUM), ou au moins trois délivrances d'au moins un médicament spécifique au traitement de l'infection par le VIH dans l'année n à différentes dates, ou personnes ayant eu un acte de biologie médicale spécifique de l'infection par le VIH dans l'année n. Les taux standardisés ont été calculés avec comme dénominateur le référentiel des bénéficiaires ayant consommé au moins une fois un soin dans les trois dernières années.

En savoir plus :



ORS-IDF.ORG