


## La syphilis

Données en Île-de-France




La syphilis est une infection sexuellement transmissible (IST) causée par la bactérie *Treponema pallidum*. Longtemps en recul grâce aux antibiotiques, elle connaît depuis les années 2000 une résurgence en Europe et particulièrement en Île-de-France.

Transmissible lors de rapports sexuels non protégés, elle peut évoluer en plusieurs stades si elle n'est pas dépistée et traitée. Son suivi est un enjeu majeur de santé publique, notamment dans les grandes métropoles.


Cette infographie présente des données sur les dépistages et les diagnostics de syphilis accompagnées d'informations sur les causes, les symptômes et la prévention.

## Les nouveaux diagnostics de syphilis : les chiffres

2 648 personnes détectées en 2024







**94%**  
hommes



- En Île-de-France, en 2024, 2 648 personnes ont eu un diagnostic de syphilis, soit un taux d'incidence de cas détectés de 21,3 pour 100 000 habitants, les hommes représentent plus de 90 % des nouveaux cas diagnostiqués.
- Chez les femmes et chez les hommes, la classe d'âge la plus concernée par la syphilis est celle des 26-49 ans (respectivement de 4,0 pour 100 000 et 83,6 pour 100 000).
- En 2024, le nombre de diagnostics de syphilis francilien repart à la hausse après s'être stabilisé entre 2022 et 2023.

## Caractéristiques socio-démographiques

Les chiffres des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd)



## Mode de contamination



- La syphilis est très transmissible :
  - par les pénétrations vaginales ou anales ou le sexe oral sans préservatif.
  - par le sang (partage d'aiguille, piercing, tatouage avec du matériel non stérile).
  - de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement.

## Symptômes


- Les premiers signes apparaissent deux à quatre semaines après la transmission.
- Plusieurs phases :
  - syphilis primaire -> apparition de chancre : petite plaie indolore souvent génitale, anale ou buccale
  - syphilis secondaire ->éruption cutanée sur le corps, les paumes ou plantes de pieds -> fièvre, fatigue, ganglions
  - phase latente -> pas de symptômes
  - syphilis tertiaire - non traitée après plusieurs années -> atteintes graves et irréversibles du cœur, du cerveau, des nerfs et en dernier stade mortelle.

## Traitements


- La syphilis se traite par antibiotiques (voie orale ou par injection).

# Le dépistage : les chiffres


Taux de dépistage pour 1 000 habitants, par genre et âge en Île-de-France, en 2024



Évolution en Île-de-France  
taux de dépistage pour 1 000 habitants



Taux de dépistage  
pour 1 000 habitants tous âges et genres, par département, en  
Île-de-France, en 2024



- Chez l'homme, le taux de dépistage s'établit à 54,3 pour 1 000 en 2024 et chez la femme à 81,6 pour 1 000.
- Les taux de dépistages sont les plus élevés entre 26 et 49 ans.
- Le dépistage de la syphilis est en augmentation depuis 2014.
- Le taux de dépistage départemental diminue de Paris vers la périphérie de la région, en rapport probable avec les difficultés d'accès au dépistage.

## Comment se protéger ?

### Prévention

#### Dépistage

▲ La prévention de la syphilis repose sur l'utilisation du préservatif lors de tout rapport sexuel, qu'il soit vaginal, anal ou oral.

▲ L'éducation sexuelle et la sensibilisation aux moyens de protection efficaces pour une sexualité plus sûre jouent un rôle important dans la prévention de cette infection.

▲ La Haute Autorité de santé (HAS)<sup>1</sup> a élaboré une recommandation de bonnes pratiques relatives à l'utilisation de la doxycycline en prévention des IST bactériennes (chlamydoïse, gonorrhée, syphilis).

▲ Un traitement post exposition par doxycycline (TPE-Doxy) après un rapport à risque peut être envisagé dans certaines populations - hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH) et femmes trans à haut risque -.

▲ Le diagnostic de la syphilis s'effectue par examen médical et prise de sang.

▲ Un test sérologique est conseillé annuellement à certains groupes de population : les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes fréquentant les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes ayant des rapports avec plusieurs partenaires sur l'année et les partenaires sexuels d'une personne infectée.

▲ Le dépistage est obligatoire chez la femme enceinte au premier trimestre de grossesse.

▲ La Haute Autorité de santé (HAS) recommande le dépistage après tous nouveaux partenaires et/ou une fois par an chez les femmes de 15-24 ans.



### Bon à savoir

Médecin, gynécologue ou sage femme conseillent et peuvent prescrire un test de dépistage des IST.

Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CéGIDD) ou centres de santé sexuelle, les dépistages sont anonymes et gratuits

"Mon test IST" est une initiative de dépistage sans ordonnance en laboratoire de biologie médicale. Elle inclut des tests de diagnostic avancé pour les infections suivantes : chlamydia, gonorrhée, hépatite B et syphilis et VIH<sup>2</sup>.



Santé publique France

<sup>1</sup> Doxycycline en prévention des infections sexuellement transmissibles bactériennes. HAS janvier 2025. [https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2025-01/rec0501\\_reco\\_doxycycline\\_cd\\_2025\\_01\\_23.pdf](https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2025-01/rec0501_reco_doxycycline_cd_2025_01_23.pdf)

<sup>2</sup> Ameli. Dépistage des IST en laboratoire sans ordonnance : Mon test IST. <https://www.ameli.fr/paris/laboratoire-danalyses-medicale/exercice-liberal/prise-charge-patients/depistage-ist/mon-test-ist-depistage-en-laboratoire-sans-ordonnance>

Sources : SNDS - Exploitation Santé Publique France ; Cas CeGIDD : Enquête SurCeGIDD Santé Publique France

Pour en savoir plus :  
ARS Île-de-France : <https://www.iledefrance.ars.sante.fr/>

